



Δ.Ε.Β.Ε.

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

**Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Επιμόρφωσης** έτους 2014

**3η
Επιστημονική
Εκδήλωση**

21 - 22 Φεβρουαρίου 2014
Ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον
Βέροια

**Ημερίδα
Ενημέρωσης του κοινού**
23 Φεβρουαρίου 2014

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

Υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας

Δράστε νωρίς



Σιταγλιπτίνη
(αναστολέας του DPP-IV)

VS

Victoza®

Γλιμεπρίδη
(SU)

VS

Victoza®

Ροσιγλιταζόν
(TZD)

VS

Victoza®

**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΣΔΤ2 ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ⁶
ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ^{1,3}**

To position statement των ADA/EASD περιλαμβάνει τη χρήση των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1, όπως το Victoza®, αμέσως μετά τη μετφορμίνη.⁴

DPP-IV=διπεπτιδύλη-πепτιδάση, SU=σοουλφονουρία, TZD=θιαζολιδινεδιόν, GLP-1=γλυκαγονόμορφο πεπτιδο-1.

Victoza®
liraglutide injection

ADA=Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία
EASD=Ευρωπαϊκή Διαβητολογική Εταιρεία.

⁶Ο στόχος ορίζεται HbA1c < 7%.

Βιβλιογραφία: 1. Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. One year of liraglutide treatment offers sustained and more effective glycaemic control and weight reduction compared with sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes: a randomised, parallel-group, open-label trial. *Int J Clin Pract*. 2011;65(4):397-407. 2. Nauck M, Frid A, Hermans K, et al; for the LEAD-2 Study Group. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action in diabetes)-2 study. *Diabetes Care*. 2009;32(1):84-90. 3. Marre M, Shaw J, Bránale M, et al; on behalf of the LEAD-1 SU study group. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone or placebo in subjects with type 2 diabetes (LEAD-1 SU). *Diabet Med*. 2009;26(3):268-278. 4. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care*. 2012;35(6):1364-1379. <http://care.diabetesjournals.org/content/early/2012/04/19/1364-1379>.

Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Όνομασία του φαρμακευτικού προϊόντος Victoza 6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεωμενική ουσιακή τύπου πένος. Ποσότητα και ποσότητα ενέσιμου: Ένα ml διαλύματος περιέχει 6 mg liraglutιδίου. Μία προγεωμενική ουσιακή τύπου πένος περιέχει 18 mg liraglutιδίου σε 3 ml. Θεραπευτικές ενδείξεις Το Victoza ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για την επίτευξη γλυκαιμικού ελέγχου. Σε συνδυασμό με μετφορμίνη ή σουλφονουρία, μετφορμίνη και σουλφονουρία, ή μετφορμίνη και θιαζολιδινεδιόν, δραστικών Προκειμένου να βελτιωθεί η γαστρεντερική άνεση, η αρχική δόση είναι 0,6 mg liraglutιδίου ημερησίως. Μετά από μία εβδομάδα τουλάχιστον, η δόση πρέπει να αυξάνεται στα 1,2 mg. Ορισμένοι ασθενείς αναμένεται να ωφεληθούν από μια αύξηση της δόσης από τα 1,2 mg στα 1,8 mg και με βάση την κλινική ανταπόκριση, μετά από μία εβδομάδα τουλάχιστον, η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 1,8 mg προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω ο γλυκαιμικός έλεγχος. Ημερήσιες δόσεις μεγαλύτερες των 1,8 mg δε συνιστώνται. Αντενδείξεις Υπερμεταβολισμός στη δραστηρία ουσία ή σε κάποιο από τα ένδοξα. Πρόσφατη χορήγηση Το Victoza δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Το Victoza χορηγείται μία φορά ημερησίως οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από το γεύμα, και μπορεί να εγχειθεί οποιαδήποτε στην κοιλία, στο μηρό ή στο βραχίονα. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Το Victoza δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Το Victoza δεν είναι υποκατάστατο της ινσουλίνης Η προώθηση liraglutιδίου σε ασθενείς που λαμβάνουν άλλα θεραπευτικά με ινσουλίνη δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα και συνιστά δε συνιστάται. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III Η εμπειρία με την ταξινόμηση κατά NYHA (New York Heart Association), δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III-IV σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά NYHA (New York Heart Association). Υπάρχει

περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με φλεγμονώδη εντερική νόσο και διαβητική γαστροπάρεση και, κατά συνέπεια, το Victoza δε συνιστάται στους ασθενείς αυτούς. Η χρήση του Victoza συσχετίζεται με παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος, όπως ναυτία, έμετος και διάρροια. Η χρήση αναμένεται λίγα περυσιακά οξεία παγκρεατίτιδος. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της οξείας παγκρεατίτιδος, επίμονο, σοβαρό κοιλιακό άλγος, εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδος, το Victoza καθώς και άλλα δυνητικά ύποπτα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να διακόπτονται. Κατά την διεξαγωγή κλινικών δοκιμών αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στο θυρεοειδή αδένος, που περιελάμβαναν αύξηση της καλσιτονίνης στο αίμα, βρογχόσπασμο και θυρεοειδικά νεοπλασμάτα ειδικά σε ασθενείς με προϋπάρχοντα θυρεοειδή νόσο. Οι ασθενείς που λαμβάνουν το Victoza σε συνδυασμό με σουλφονουρία ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας μπορεί να ελαττωθεί με μείωση της δόσης της σουλφονουρίας. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ως θεραπεία το Victoza έχουν αναφερθεί οξεία και συμπτωμάτα αρθροπάθειας, τα οποία περιλαμβάνουν νεφρική δυσλειτουργία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Εγκυμοσύνη: Το Victoza δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αντί αυτού συνιστάται η χρήση ινσουλίνης. Θηλασμός: Λίγη έλλειψη εμπειρίας, το Victoza δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα: Εκτός από μια μικρή μείωση στον αριθμό των ζώντων εμβρυϊκών μισθίων, μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν άμεσες επιβλαβείς επιπτώσεις σε σχέση με τη γονιμότητα. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν από μακράς διαρκείας ελεγχόμενες μελέτες φάσης III και από αυθόρμητες αναφορές είναι: Συνδυασμός λιραγλουτίδης με μετφορμίνη: Συχνές (ανερούς, μειωμένη όρεξη, ζάλη, έμετος, δυσπεψία, γαστρίτις, αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης). Πολύ συχνές (κεφαλαλγία, ναυτία, διάρροια). Συνδυασμός λιραγλουτίδης με γλιμεπρίδη: Συχνές (φροσασυγνιότητα, υπογλυκαιμία, ανερούς, ναυτία, διάρροια, έμετος, δυσπεψία, δυσκολία στην κατάποση, κολική διασπορά, αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης). Συνδυασμός λιραγλουτίδης με μετφορμίνη και θιαζολιδινεδιόν: Συχνές (ανερούς, μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγία, δυσπεψία, δυσκολία στην κατάποση, κολική διασπορά, αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης) - Συχνές (βρογχόσπασμο, ανερούς, κεφαλαλγία, έμετος, δυσπεψία, άλγος από καλιακή χώρα, δυσκολία στην οδοντολογία) - Πολύ συχνές (υπογλυκαιμία, ναυτία, διάρροια). Συνδυασμός λιραγλουτίδης με μετφορμίνη και ροσιγλιταζόν: Συχνές (ανερούς, μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγία, δυσπεψία, δυσκολία στην κατάποση, κολική διασπορά, αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης) - Πολύ συχνές (ναυτία, διάρροια, έμετος). Σε λίγες περιπτώσεις (<0,2%) αναφέρθηκε εμφάνιση οξείας παγκρεατίτιδος κατά τη διάρκεια μακράς διαρκείας κλινικών δοκιμών με το Victoza. Η παγκρεατίτιδα αναφέρθηκε επίσης μετά την κυκλοφορία. Τα θυρεοειδικά νεοπλασμάτα, η αύξηση της καλσιτονίνης του αίματος και οι βρογχόσπασμοι ήταν οι ανεπιθύμητες ανεπιθύμητες ενέργειες που θυρεοειδούς Αυθόρμητες αναφορές Συχνές (Εξάνθημα). Όχι συχνές (δύσπνοια, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρική δυσλειτουργία, Αιφύπνιση, Κίτριση, Κίτριση). Σπάνιες (ανοσολαβητικές αντιδράσεις). Κάτοχος της οξείας κυκλοφορίας Novo Nordisk AS, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Δανία. Αριθμός οξείας κυκλοφορίας: EU/1/09/529/001-005. Ημερομηνία πρώτης έγκρισης/Ανανέωση της οξείας: 30/06/2009. Ημερομηνία ανανέωσης: κεμάρου: 03/2013. Περιορισμένη πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. Χρησιμοποιήστε με ασφάλεια τη συσκευή.

Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Α1, Παναγούλη 80 & Αγ. Τριτάδος 65
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
Συμπληρώστε την «**KITRINH KAPTA**»

Αναφέρατε:

- **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για το Νέο φάρμακο [N]
- Τις **ΣΟΒΑΡΕΣ** ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Γνωστά φάρμακα

novo nordisk®



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του πρωτοποριακού **Ετήσιου Προγράμματος Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης** των συναδέλφων, η Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος προχωρεί στην υλοποίηση του δεύτερου κύκλου του φιλόδοξου αυτού προγράμματος.

Η πόλη της Βέροιας θα φιλοξενήσει την **3η Επιστημονική Εκδήλωση**, στις **21 - 23 Φεβρουαρίου 2014**.

Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης βασίζεται στην ανάγκη των περισσότερων συναδέλφων για απαντήσεις σε θέματα καθημερινής κλινικής πράξης και λύσεις που τους απασχολούν τακτικά.

Στο πλαίσιο αυτό, και με γνώμονα τη διάδοση της γνώσης σε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους της περιφέρειας, θα υπάρξουν εμπεριστατωμένες ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες, καθώς και παρουσίαση συγκεκριμένων ενδιαφερόντων περιστατικών που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα για όλους μας.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, την **Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014** θα πραγματοποιηθούν ομιλίες που θα απευθύνονται στο κοινό, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας στη ρύθμιση του **Σακχαρώδη Διαβήτη**. Οι προηγούμενες εκδηλώσεις αυτές είχαν μεγάλη απήχηση πέρυσι, γεγονός που μας γεμίζει με αισιοδοξία, αλλά παράλληλα μας επιφορτίζει με περισσότερες ευθύνες για το 2014.

Στην προσπάθειά μας αυτή, και με δεδομένη την περυσινή μεγάλη αποδοχή εκ μέρους των συναδέλφων, προσβλέπουμε στην ενεργή συμμετοχή σας προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα που απασχολεί όλους μας, το **Σακχαρώδη Διαβήτη**.

Με τις θερμότερες ευχές, τόσο τις προσωπικές μου, όσο και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για μια δημιουργική νέα χρονιά γεμάτη υγεία και αισιοδοξία, σας περιμένουμε στην πανέμορφη Βέροια!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος της ΔΕΒΕ
Κ. Καζάκος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

19:00 - 20:00 Προσέλευση - Εγγραφές

20:00 - 20:30 Τελετή έναρξης
Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί20:30 - 21:15 **Η επιδημιολογία του σακχαρώδη διαβήτη.
Το μέγεθος του προβλήματος**
Προεδρείο: **Ε. Πάγκαλος**
Ομιλητής: **Κ. Καζάκος****ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014**

Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

10:00 - 11:30 **Επίκαιρα θέματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη**
Προεδρείο: **Ε. Πάγκαλος, Δ. Καραγιάννη**

- Αρτηριακή υπέρταση στο Σακχαρώδη Διαβήτη - Μ. Δούμας
- Υπογλυκαιμία. Νεότερα δεδομένα - Σπ. Μπακατσέλος
- Πολυκυστικές ωοθήκες - Κ. Κώτσα

11:30 - 12:00 **Δ ι α λ ε ι μ μ α**12:00 - 13:30 **Ενδιαφέροντα θέματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη**
Προεδρείο: **Χρ. Σαμπάνης, Χρ. Κούτρας**

- Οξείες υπεργλυκαιμικές καταστάσεις - Μ. Ζωγράφου
- Διαβητική δυσλιπιδαιμία - Α. Βασιλείου
- Αντισταμοπεταλιακή αγωγή
στο Σακχαρώδη Διαβήτη - Ι. Ζωγράφου

13:30 - 14:00 **S p e a k e r s ' C o r n e r**14:00 - 17:00 **Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή δ ι α κ ο π ή**17:00 - 18:30 **Ενδιαφέροντα θέματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη**
Προεδρείο: **Χ. Μανές**

- Ινσουλινοθεραπεία στο Σακχαρώδη Διαβήτη - Γ. Κούρτογλου
- Οδοντικές παθήσεις στο Σακχαρώδη Διαβήτη - Α. Ματιάκης
- Διαβήτη της κήσης - Γ. Κούλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- 18:30 - 19:00 Διάλειμμα
- 19:00 - 20:00 Επιπλοκές Σακχαρώδη Διαβήτη
Προεδρείο: **Μ. Αρχανιωτάκη**
- Διαβητικό πόδι - Τ. Διδάγγελος
 - Χρόνια νεφρική νόσος - Π. Σαραφίδης

20.00 - 21.00

Δορυφορική Διάλεξη

Alliance BMS/AZ

Επιτυγχάνοντας τους θεραπευτικούς στόχους στο ΔΤ2 με καρδιαγγειακή ασφάλεια:

Νεότερα δεδομένα για τους αναστολείς της DPP4

Προεδρείο: **Κ. Καζάκος**

Ομιλήτρια: **Δ. Καραγιάννη**

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Αντωνιάδης
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

- 11.00 - 12.00 Διατροφή και φαρμακευτική αγωγή στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Συντονιστές: **Κ. Καζάκος, Χ. Κούτρας**
- Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης - Α. Βαμβάκης
 - Νεότερα φάρμακα στο Σακχαρώδη Διαβήτη - Π. Μάρας
- 12.00 - 13.00 Έλεγχος - Επιπλοκές Σακχαρώδη Διαβήτη
Συντονιστές: **Ε. Πάγκαλος, Χ. Μανές**
- Ο αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη - Χρ. Σαμπάνης
 - Φροντίδα διαβητικού ποδιού - Δ. Παπαδοπούλου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Αρχανιωτάκη Μαριάνθη

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος Ε. Ι. & Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Βαμβάκης Αναστάσιος

Κλινικός - Αθλητικός Διατολόγος - Διατροφολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο, Συνεργάτης Παιδοδιαβητολογικού Ιατρείου Γ' Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη

Βασιλείου Αικατερίνη - Μαρία

Παθολόγος, Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, Γιαννιτσά

Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Δούμας Μιχαήλ

Λέκτορας Παθολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ζωγράφου Ιωάννα

Επιμελήτρια Α', Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη

Ζωγράφου Μοσχianή

Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, Εξειδικευθείσα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου, Βέροια

Καζάκος Κυριάκος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Πρόεδρος Δ.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη

Καραγιάννη Δέσποινα

Παθολόγος - Διαβητολόγος, τ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Θεσσαλονίκη

Κούλας Γεώργιος

Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Πολυιατρείο ΕΟΠΥΥ Νάουσας, Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη

Κούτογλου Γεώργιος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνος Παθολογικού & Διαβητολογικού Τμήματος, Κλινική "Άγιος Λουκάς", Θεσσαλονίκη

Κούτρας Χρήστος

Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, Βέροια

Κώστα Καλλιόπη

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογίας, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Μανές Χρήστος

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

Μάρας Περικλής

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Πολυιατρείο ΕΟΠΥΥ Βέροιας

Ματιάκης Απόστολος

Διδάκτωρ Στοματολογίας Α.Π.Θ., Χειρουργός Οδοντίατρος, Θεσσαλονίκη

Μπακατσέλος Σπύρος

Παθολόγος, Διδάκτωρ Διαβητολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συντονιστής Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη

Πάγκαλος Εμμανουήλ

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής "ΘΕΡΜΗ", Θεσσαλονίκη

Παπαδοπούλου Δέσποινα

Επιμελήτρια Α', Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, Ξάνθη

Σαμπάνης Χρήστος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Διευθυντής ΕΣΥ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη

Σαραφίδης Παντελής

Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οργάνωση



Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Παπανδρέου 39, 54646 Θεσσαλονίκη,

Τηλ: 2310250034, Fax: 2310250084, E-mail: info@ngda.gr, Website: www.ngda.gr

Τόπος και ημερομηνίες διεξαγωγής

Επιστημονικό Πρόγραμμα:

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου & Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Νέα Περιφερειακή Οδός Βέροιας - Νάουσας, 59100 Βέροια, Τηλ.: 23310 77777

Ημερίδα ενημέρωσης κοινού:

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

Αντωνιάδεις Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

Αвт. Αντωνιάδη 19, 59100, Βέροια

Γραμματεία εκδήλωσης



FREE SPIRIT

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας

Τηλ.: 210-6048260, Fax : 210-6047457, E-mail: LParissi@free-spirit.gr, Website: www.free-spirit.gr

Μοριοδότηση

Η επιστημονική εκδήλωση αξιολογείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 9 μόρια (credits) αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Μ.Ε./CME-CPD).

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Η παράδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη του επιστημονικού προγράμματος. Πιστοποιητικό παρακολούθησης δικαιούνται όλοι οι συμμετέχοντες, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο θα παραδίδεται από τη γραμματεία της επιστημονικής εκδήλωσης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων

Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής εκδήλωσης θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους.

Διαλέξεις

Λόγω της πυκνότητας του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται οι ομιλητές να τηρήσουν το χρόνο ομιλίας τους.

Σημαντική ανακοίνωση για τους ομιλητές

Σύμφωνα με την τροποποίηση της εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ., όλοι οι συμμετέχοντες στις επιστημονικές εκδηλώσεις ομιλητές, αντί της έγγραφης δήλωσης, υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους και συγκεκριμένα στη 2η διαφάνεια μετά τον τίτλο της διάλεξης, να αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και η Οργανωτική Επιτροπή του Ετήσιου Προγράμματος Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την υποστήριξή τους.





