

Χειμερινή Ημερίδα



# Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας

**22**

Δεκεμβρίου  
2012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

**ATHENAEUM**

**INTERCONTINENTAL**

Athenaeum Ballroom III

ΑΘΗΝΑ

Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη  
του Καθηγητή Αντώνη Βαρελτζίδα

**Πρόγραμμα**

## Anti-Acne® line

Νέα ολοκληρωμένη φροντίδα  
για την καθημερινή αντιμετώπιση  
της ακμής και της λιπαρότητας



### HYDROVIT ANTI-ACNE WASH | 150ml

Καθημερινό καθαριστικό για λιπαρά με τάση ακμής και ακνεϊκά δέρματα.

#### Ιδιότητες:

- Ρύθμιση υπερέκκρισης σμήγματος
- Μείωση πόρων (μαύρα στίγματα)
- Αναστολή της δράσης του P. acnes
- Αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική δράση
- Ευνοδιατικές, επολυωτικές και καταπραυντικές ιδιότητες
- Χρησιμοποιείται σε θυλακίτιδες, ιδρώς, ιδρωταθενίτιδες



### HYDROVIT ANTI-ACNE LOTION | 200ml

Καθημερινή, δροσερή, μη λιπαρή λοσιόν, ιδανική για λιπαρά με τάση ακμής και ακνεϊκά δέρματα.

#### Ιδιότητες:

- Ρύθμιση υπερέκκρισης σμήγματος
- Μείωση πόρων (μαύρα στίγματα)
- Αναστολή της δράσης του P. acnes
- Αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική δράση
- Ευνοδιατικές, επολυωτικές και καταπραυντικές ιδιότητες
- Χρησιμοποιείται σε θυλακίτιδες, ιδρώς, ιδρωταθενίτιδες



### HYDROVIT ANTI-ACNE CREAM | 50ml

Κρέμα για την καθημερινή αντιμετώπιση της ακμής και της λιπαρότητας.

#### Ιδιότητες:

- Ρύθμιση υπερέκκρισης σμήγματος
- Μείωση πόρων (μαύρα στίγματα)
- Αντιφλεγμονώδης και αντιβακτηριακή δράση
- Αναστολή της δράσης του P. acnes
- Ευνοδιατικές και καταπραυντικές ιδιότητες
- Χρησιμοποιείται σε θυλακίτιδες, ιδρώς, ιδρωταθενίτιδες

#### Η HYDROVIT Anti-Acne® Line:

- ◆ Είναι κατάλληλη για παιδιά και ενήλικες
- ◆ Είναι συμβατή με φαρμακευτική αγωγή
- ◆ Δεν ξηραίνει και δεν ερεθίζει την επιδερμίδα
- ◆ Δεν προκαλεί φωτοευσαισθησία

Δερματολογικά ελεγχμένα + Διατίθενται μόνο στα φαρμακεία

Έδρα: Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα, τηλ.: 210 5224830, fax: 210 5224838

Υποκατάστημα: Πρωτομαγιάς 17, 543 52 Κωνσταντινούπολη/Καθαρά Θεά/Αθήνα, τηλ. & fax: 2310 942896  
e-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ  
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ...



## Indoxyl - Γρήγορη δράση.<sup>1,2</sup> Δεν υπάρχει μόνο στα παραμύθια.

Σε συσκευασία 50gr και 25gr

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΣ

**1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** INDOXYL γέλη. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** 1g γέλης περιέχει: 10mg κλινδαμικίνη ως φωσφορική κλινδαμικίνη, 50mg άνυδρο βενζοϊκό υπεροξειδίου ως άνυδρο βενζοϊκό υπεροξειδίο. Βλ. παράγραφο 6.1. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:** 4.1 **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Κοινή ακμή ήπιος ή μέτριας εντάσεως, ιδιαίτερα σε φλεγμονώδεις βλάβες. Βλ. παράγραφο 5.1. 4.2 **Δοσολογία & τρόπος χορήγησης:** Για την εφαρμογή στο δέρμα. Μόνο για εξωτερική χρήση. **Ενήλικες:** Η γέλη INDOXYL πρέπει να εφαρμόζεται μια φορά την ημέρα το βράδυ, στις πάσχουσες περιοχές του δέρματος, αφού αυτές έχουν πλυθεί καλά, ξεπλυθεί με ζεστό νερό και έχουν στεγνώσει. **Χρήση σε παιδιά:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της γέλης INDOXYL δεν έχουν αποδειχθεί σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας (κάτω των 12 ετών), αφού η κοινή ακμή εμφανίζεται σπάνια σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. **Χρήση σε ηλικιωμένους:** Δεν χρειάζονται ειδικές οδηγίες. Η θεραπεία με γέλη INDOXYL δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 12 εβδομάδες συνεχούς χρήσης. **4.3 Αντενδείξεις:** Η γέλη INDOXYL δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία σε: - κλινδαμικίνη, - λινκομυκίνη, - βενζοϊκό υπεροξειδίο, - κάποιο από τα έκδοχα του φαρμάκου. **4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η επαφή με το στόμα, τους οφθαλμούς, τις βλεφαρίδες μεμβράνες με εξελεγκμένο ή εκτεταμένο δέρμα πρέπει να αποφεύγεται. Η εφαρμογή σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος πρέπει να γίνεται με προσοχή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, χρειάζεται να γίνουν πλύσεις με άφθονο νερό. Η γέλη INDOXYL πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό περιοχικής εντερικής ή ελκώδους κολίτιδας ή κολίτιδος εξ

αντιβιοτικών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αποτικούς ασθενείς στους οποίους μπορεί να εμφανιστεί επιπλέον ηρωδερμία. Η συχνότητα εφαρμογής θα πρέπει να μειώνεται αν εμφανισθεί εκτεταμένος ερεθισμός ή ερυθρότητα. Αν εμφανιστεί παρατεταμένη ή σημαντική διάρροια ή ο ασθενής υποφέρει από κακιακές κράμπες, η θεραπεία με γέλη INDOXYL πρέπει να διακοπεί αμέσως, καθώς το συμπύκνωμα μπορεί να υποδηλώνει κολίτιδα εξ αντιβιοτικών. Πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες διαγνωστικές μέθοδοι, όπως ο προσδιορισμός του *Clostridium difficile* και της τοξίνης του και αν χρειαστεί κολονοσκόπηση και να επιλεγούν θεραπείες για την κολίτιδα. Το προϊόν μπορεί να αλλοιώσει το χρώμα των μαλλιών ή των χρωματιστών υφασμάτων. Συνιστάται να ελαχιστοποιείται η έκθεση στον ήλιο ή σε λιγνές υπεριώδους ακτινοβολίας. Πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς ότι, σε μερικές περιπτώσεις, χρειάζεται θεραπεία 4-6 εβδομάδων πριν παρατηρηθεί το πλήρες θεραπευτικό αποτέλεσμα. Διασφαρμόζουμε ανθεκτικότητα με άλλα αντιβιοτικά όπως η λινκομυκίνη και η ερυθρομυκίνη που να εμφανισθεί όταν χρησιμοποιείται μονοθεραπεία αντιβιοτικών. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνστάσεις για τη χρήση αντιβιοτικών και την επικράτηση της επίκτητης ανθεκτικότητας. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Η γέλη INDOXYL μπορεί να προκαλέσει ερυθμία, απολέπιση, ξηρότητα και κνησμό στην περιοχή της εφαρμογής. Πολύ σπάνια μπορεί να εμφανιστούν παριασθησία, επιδείνωση της ακμής και δερματίτιδα εξ επαφής. Αυτές οι τοπικές αντιδράσεις είναι τυπικά ήπιες έως μέτριας εντάσεως. Οι αναφερόμενες συχνότητες σε κλινικές μελέτες είναι: Πολύ συχνές (>10%): Ερυθμία Απολέπιση Ξηρότητα. Συχνές (>10, 1-10%): Κόψιμο Κνησμός. Μη συχνές (>1000, <100%): Παριασθησία Επιδείνωση ακμής. Δεδομένα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος έχουν δείξει πολύ χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης

αυτών των τοπικών αντιδράσεων. Σε ορισμένα ευαίσθητα άτομα, έχουν αναφερθεί μεμονωμένα περιστατικά ψευδο-μεμβρανώδους κολίτιδας ή διάρροιας λόγω άλλων τοπικών θεραπειών που περιέχουν κλινδαμικίνη. Αυτό είναι απίθανο να συμβεί με την γέλη INDOXYL, αφού τα επίπεδα κλινδαμικίνης στο πλάσμα που έχουν προσδιοριστεί και η διαδερμική απορρόφηση της κλινδαμικίνης είναι κλινικά αμελητέα. Ανθεκτικότητα μπορεί να εμφανιστεί με τη μακροχρόνια χρήση της γέλης INDOXYL. **6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος:** Να φυλάσσεται στο ψυγείο (2-8 °C). Να μην καταψύχεται. Συνήθεις φύλαξης μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία πάνω από 25°C. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Δικαιούχος: STIEFEL LABORATORIES INC. USA. Υπεύθυνος κυκλοφορίας σε Ελλάδα: GlaxoSmithKline α.ε.β.ε., Λεωφ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ 210 6882100. **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 24-9-2007.

Για την πλήρη Περιληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία GlaxoSmithKline Α.Ε.Κ. στην Αθήνα, τηλ: 210 6882100.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:

Συμπληρώστε την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναγράφεται:

- ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Νέα φάρμακα [N]
- Τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Γνωστά φάρμακα





**Frezyderm**

Όμορφο, Φρέσκο Δέρμα  
Για Πάντα

**Ενυδάτωση**

**&**

**Αντιγήρανση**

Ενυδάτωση προσώπου με πλούσιες, πολυ-λειτουργικές φόρμουλες και 2 καινοτομίες:

3 διαφορετικοί τύποι υαλουρονικού οξέος  
ενεργοποίηση των γονιδίων του δέρματος  
για την παραγωγή κολλαγόνου & ελαστίνης

Αντιμετώπιση της φωτο-, χρονο-, βιο-  
γήρανσης του δέρματος με πλούσιες φόρμουλες  
και 2 καινοτομίες:

ενεργοποίηση των γονιδίων νεότητας  
ενεργοποίηση και προστασία  
των βλαστοκυττάρων του δέρματος



ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ



PARABENS  
FREE



DERMATOLOGICAL PHARMACEUTICALS



Κεντρικά: Μεγάνδρου 75, 104 37 Αθήνα, Τ: 210 5246900, Φ: 210 5244433  
Υποκατάστημα Β. Ελλάδας: Κων. Καραμανλή 112, 54 248 Θεσσαλονίκη, Τ: 2310 327210, Φ: 2310 327211  
e: info@frezyderm.com, www.frezyderm.com, τηλ. επικοινωνίας: 210 5246900



**FREZYDERM**  
DERMOCHEMICALS - PHARMACEUTICALS  
NUTRITION PRODUCTS



# Χειμερινή Ημερίδα

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■	Μήνυμα Προέδρου	7
■	Συμβούλια & Επιτροπές	9
■	Επιστημονικό Πρόγραμμα	10
■	Ευρετήριο Προέδρων & Ομιλητών	12
■	Γενικές Πληροφορίες	13
■	Εκλογή Νέων Μελών	14
■	Προσεχή δερματολογικά συνέδρια	16

 **head &  
shoulders**

**No.1**

**ΑΝΤΙΠΙΤΥΡΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ  
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ\***

**ΕΩΣ ΚΑΙ**

**100% ΧΩΡΙΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑ\*\***





# Χειμερινή Ημερίδα

## ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Χειμερινή Ημερίδα έμελλε να είναι η πρώτη που γίνεται στην Αθήνα για το έτος 2012, ακολουθώντας το Κύπρο-Ελλαδικό Συνέδριο που έγινε στην Πάφο και τη Φθινοπωρινή Ημερίδα στο Costa Navarino της Πύλου, συνέδρια που στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία.

Η συμμετοχή σας στη Χειμερινή Ημερίδα είναι πολύ σημαντική για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, η Ημερίδα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του **Καθηγητή Αντώνη Βαρελιτζή**, του άοκνου αυτού εργάτη της επιστήμης της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, ο οποίος υπήρξε και Δάσκαλος πολλών εξ' ημών και δεύτερον, στο τέλος της Ημερίδας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν οι αλλαγές του Καταστατικού.

Οι προτεινόμενες από το Δ.Σ. αλλαγές του Καταστατικού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της **ΕΔΑΕ** ([www.edae.gr](http://www.edae.gr)) εδώ και 5 μήνες, με σκοπό να σας δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος για να τις μελετήσετε και να κάνετε έγκαιρα τις προτάσεις σας, εάν επιθυμούσατε να τροποποιηθεί κάποια διάταξη, ώστε να μην σπαταλήσουμε ανώφελα χρόνο κατά τη διάρκεια της Καταστατικής Συνέλευσης.

Θα ήθελα να τονίσω ότι το υπάρχον Καταστατικό ψηφίστηκε το 1997 και κρίνεται πλέον απαραίτητο και επιβεβλημένο να αλλάξει, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονισθεί με τις τωρινές ανάγκες και προκλήσεις της εποχής μας. Επομένως, η συμμετοχή σας στην Καταστατική Συνέλευση είναι πολύ σημαντική, γιατί θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. λοιπόν, σας περιμένουμε όλους να μας συνδράμετε στο δύσκολο έργο της αναδιαμόρφωσης του Καταστατικού μας.

Τέλος, και συμβαδίζοντας με το γιορτινό πνεύμα των ημερών, θα ήθελα να σας ευχηθώ **ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!**

Ο Πρόεδρος  
**Δημήτρης Ρηγόπουλος**



# Stelara<sup>®</sup>

(ustekinumab)



janssen 

PHARMACEUTICAL COMPANIES  
OF *Johnson & Johnson*

**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**

• Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη,  
Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000





# Χειμερινή Ημερίδα

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: **Δ. Ρηγόπουλος**  
Αντιπρόεδρος: **Ι. Μπάρκης**  
Γεν. Γραμματέας: **Γ.Χ. Χαϊδεμένος**  
Ταμίας: **Α. Στρατηγός**  
Ειδ. Γραμματέας: **Δ. Σωτηριάδης**  
Μέλη: **Π.Γ. Σταυρόπουλος**  
**Π. Κωστάκης**

### ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: **Χρυσομάλλης Φώτιος**  
Μέλη: **Μπραζιζιώτης Απόστολος**  
**Σταυριανέας Νικόλαος**

### ΕΞΕΛΕΓΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Γρηγορίου Σταμάτης**  
**Καυκάς Ηλίας**  
**Πραντσιδής Ανέστης**

Έδρα: Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Σπυροπούλου, Τηλ. & Fax: 210 7295606  
Θεσ/νίκη: κα Λίτσα Χατζοπούλου, Τηλ.: 2310 886600

Διεύθυνση: Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία  
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Αθήνα  
E-mail: edaegr@hotmail.com, edae@edae.gr • [http:// www.edae.gr](http://www.edae.gr)

### ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6048260, Φαξ: 210 6047457  
E-mail: LParissi@free-spirit.gr  
Website: [www.free-spirit.gr](http://www.free-spirit.gr)



# Χειμερινή Ημερίδα

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**09.00 - 10.15**

### Τι νεώτερο στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία

Προεδρείο: **Χ. Αντωνίου, Κ. Κουσκούκης**

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ■ Παιδοδερματολογία                 | <b>Χ. Στεφανάκη</b>           |
| ■ Ψωρίαση                           | <b>Σ. Κρύγκερ - Κρασαγάκη</b> |
| ■ Ακμή / ροδόχρους νόσος            | <b>Κ. Δεσινιώτη</b>           |
| ■ Κολλαγονώσεις                     | <b>Π. Σταυρόπουλος</b>        |
| ■ Μη ουλωτικές αλωπεκίες            | <b>Κ. Κουσκούκης</b>          |
| ■ Δερματο-Ογκολογία                 | <b>Ε. Σωτηρίου</b>            |
| ■ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα | <b>Η. Νικολαΐδου</b>          |
| ■ Δερματοσκόπηση                    | <b>Α. Κατούλης</b>            |
| ■ Κοσμητική Δερματολογία            | <b>Δ. Ντάσιου</b>             |

**10.15 - 11.45**

### Επιστημονική εκδήλωση στη μνήμη του εκλιπόντος Καθηγητή Αντώνη Βαρελτζίδη

#### Η ζωή και το έργο του

Προεδρείο: **Α. Κατσάμπας, Δ. Ρηγόπουλος, Ν. Σταυριανέας, Δ. Σωτηριάδης**

#### Στρογγυλό Τραπέζι στη μνήμη του

Προεδρείο: **Γ. Αυγερινού, Α. Κατσάμπας, Ν. Σταυριανέας**

- |                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| ■ Αγγιεΐδες: Ότι νεώτερο                          | <b>Α. Τόσκα</b>     |
| ■ Ο αδιάγνωστος δερματολογικός ασθενής            | <b>Ι. Χατζής</b>    |
| ■ Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος: Σύγχρονη θεώρηση | <b>Γ. Αυγερινού</b> |

#### Ειδική Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Κατσάμπας, Ν. Σταυριανέας**

- |                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ■ Η επίδραση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας στη μικροκυκλοφορία | <b>Κ. Κατσένης</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|

# 22

## Δεκεμβρίου 2012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ATHENAEUM

INTERCONTINENTAL

Atheneum Ballroom III

ΑΘΗΝΑ

### ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.45 - 12.15

Διάλειμμα - Καφές

12.15 - 13.00

#### Διάλεξη

Προεδρείο: **Χ. Αντωνίου, Δ. Ιωαννίδης**

**Διεθνής ομοφωνία για τη θεραπεία της ψωρίασης:  
δίνοντας απαντήσεις για την μετάβαση από:**

- Κλασσική συστηματική αγωγή σε βιολογική θεραπεία **Δ. Ιωαννίδης**
- Βιολογική θεραπεία σε άλλη βιολογική θεραπεία **Χ. Αντωνίου**

13.00 - 18.00

Γενική Καταστατική Συνέλευση ΕΔΑΕ



# Χειμερινή Ημερίδα

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΟΜΙΛΗΤΩΝ

### **Αντωνίου Χριστίνα**

Καθηγήτρια Δερματολογίας, Διευθύντρια Α' Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"

### **Αυγερινού Αντωνία**

Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Α' Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"

### **Δεσινιώτη Κλειώ**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"

### **Ιωαννίδης Δημήτριος**

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

### **Κατούλης Αλέξανδρος**

Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

### **Κατσάμπας Ανδρέας**

Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

### **Κατσένης Κωνσταντίνος**

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Αγγειοχειρουργικής Μονάδας Β' Χειρουργικής Κλινικής, "Αρεταίειο" Νοσοκομείο

### **Κουσκούκης Κωνσταντίνος**

Καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

### **Κρύγκερ - Κρασαγάκη Σαμπίνε**

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας, Δερματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης

### **Νικολαΐδου Ηλέκτρα**

Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"

### **Ντάσιου Δήμητρα**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δερματοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"

### **Ρηγόπουλος Δημήτριος**

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

### **Σταυριανέας Νικόλαος**

Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

### **Σταυρόπουλος Παναγιώτης**

Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"

### **Στεφανάκη Χριστίνα**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"

### **Σωτηριάδης Δημήτριος**

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης

### **Σωτηρίου Ελένη**

Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

### **Τόσκα Ανδρονίκη**

Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια Δερματολογικής-Αφροδισιολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

### **Χατζής Ιωάννης**

Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων



## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental

Λεωφ. Συγγρού 89 - 93, 117 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 9206000

Συνεδριακή αίθουσα	Athenaeum Ballroom III	Επίπεδο -2
Έκθεση ημερίδας	Athenaeum Ballroom I & II, Foyer	Επίπεδο -2
Γραμματεία ημερίδας	Foyer	Επίπεδο -1

### Ημερομηνία διεξαγωγής

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

### Ώρες λειτουργίας γραμματείας

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012, **08.30 - 13.00**

### Κονκάρδες

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία της εκδήλωσης και είναι απαραίτητες για την είσοδο, τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

### Μοριοδότηση

Η εκδήλωση μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με μόρια (credits) αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Μ.Ε./CME-CPD).

### Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Η παράδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί το **Σάββατο 22 Δεκεμβρίου** με τη λήξη του επιστημονικού προγράμματος. Πιστοποιητικό παρακολούθησης δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες της ημερίδας, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο θα παραδίδεται από τη γραμματεία.

### Εγγραφές

Η συμμετοχή στη Χειμερινή Ημερίδα της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας είναι **δωρεάν**.

### Πληροφορίες για τους ομιλητές

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας.

### Πληροφορίες για τη Γενική Καταστατική Συνέλευση της ΕΔΑΕ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Γενική Καταστατική Συνέλευση της ΕΔΑΕ, είναι να έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές σας εκκρεμότητες, όσον αφορά την υποχρεωτική ετήσια συνδρομή σας προς την εταιρεία. Μόνον όσοι είναι "ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ", δηλαδή έχουν πληρώσει ΚΑΙ την ετήσια συνδρομή του 2012 μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Καταστατική Συνέλευση της ΕΔΑΕ. Τα "ταμειακώς εντάξει" μέλη θα προμηθευθούν 1 πράσινη, 1 κόκκινη και 1 λευκή κάρτα από τη Γραμματεία της ΕΔΑΕ, απαραίτητες για την ψηφοφορία.



# Χειμερινή Ημερίδα

## ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

- Στη Χειμερινή Ημερίδα που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 2011 στην Αθήνα, εξελέγησαν μέλη της εταιρείας οι παρακάτω:

### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΒΡΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
ΔΑΓΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΙΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΣΙΟΥΜΑ ΖΩΓΡΑΦΩ

### ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΜΠΑΝΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ  
ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  
ΤΣΙΚΕΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

- Στην Εαρινή Ημερίδα που έγινε στις 7 Απριλίου 2012 στη Θεσσαλονίκη, εξελέγησαν μέλη της εταιρείας οι παρακάτω:

### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  
ΔΡΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  
ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  
ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΠΙΤΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

### ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ  
ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΑΛΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ  
ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
ΚΟΛΕΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΓΔΑ  
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΛΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  
ΠΕΛΙΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΕΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΣΙΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ  
ΣΤΟΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ  
ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ**

- Στη Φθινοπωρινή Ημερίδα με θέμα “Δέρμα & Υγεία” που έγινε στις 7 - 9 Σεπτεμβρίου 2012 στην Πύλο Μεσσηνίας, εξελέγησαν μέλη της εταιρείας οι παρακάτω:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

**ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΑΓΓΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΖΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΑΤΟΥΛΑ ΘΕΩΝΗ  
ΠΙΚΟΥ ΟΛΓΑ  
ΤΣΑΒΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



# Χειμερινή Ημερίδα

## ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

### **ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΨΩΡΙΑΣΗ: ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ»**

18 - 20 Ιανουαρίου 2013

Ξενοδοχείο Xenia Portaria,  
Πορταριά Πηλίου  
Info: [www.free-spirit.gr](http://www.free-spirit.gr)  
Τηλ.: 210 6048260, 210 6047476

### **71<sup>st</sup> ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY**

1 - 5 March 2013

Miami, FL, United States  
Info: American Academy of Dermatology  
Tel.: 866-503-SKIN (7546) / 847-240-1280  
Fax: 847-240-1859  
E-mail: [MRC@aad.org](mailto:MRC@aad.org)

### **ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ**

27 Απριλίου 2013

Ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ, Θεσσαλονίκη  
Info: [info@mael.gr](mailto:info@mael.gr)  
Τηλ.: 2310 837722

### **39<sup>ο</sup> ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ**

22 - 25 Μαΐου 2013

Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

### **10<sup>th</sup> EADV SPRING SYMPOSIUM**

23 - 26 May 2013

Cracow, Poland  
Website: [www.eadv.org](http://www.eadv.org)

### **9<sup>th</sup> WORLD CONGRESS OF COSMETIC DERMATOLOGY**

27 - 30 Ιουνίου 2013

Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα  
Website: [www.wcocd2013.com](http://www.wcocd2013.com)

### **8<sup>th</sup> CONGRESS OF MELANOMA**

18 - 20 July 2013

Hamburg, Germany  
Congress Center Hamburg (CCH)  
Website: [www.worldmelanoma2013.com](http://www.worldmelanoma2013.com)



# 22

## Δεκεμβρίου 2012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ATHENAEUM

INTERCONTINENTAL

Athenaeum Ballroom III

ΑΘΗΝΑ

### ΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

**2013 SUMMER (ACADEMY) MEETING  
OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY**

30 July - 3 August 2013

New York, NY, United States  
Info: American Academy of Dermatology  
Tel.: 866-503-SKIN (7546)/847-240-1280  
Fax: 847-240-1859  
E-mail: MRC@aad.org

**12<sup>th</sup> World Congress of Pediatric Dermatology**

25 - 27 September 2013

Madrid, Spain  
Info: www.wcpd2013.com

**22<sup>nd</sup> EADV Congress**

3 - 6 October 2013

Κωνσταντινούπολη  
Website: www.eadv.org

**ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΔΕ  
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**

19 Οκτωβρίου 2013

Αθήνα

**ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΔΕ  
ΕΚΛΟΓΕΣ**

14 Δεκεμβρίου 2013

Αθήνα

**72<sup>nd</sup> ANNUAL MEETING  
OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY**

21 - 25 March 2014

Denver, CO, United States  
Info: American Academy of Dermatology  
Tel.: 866-503-SKIN (7546)/847-240-1280  
Fax: 847-240-1859  
E-mail: MRC@aad.org

**73<sup>rd</sup> ANNUAL MEETING  
OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY**

20 - 24 March 2015

San Francisco, CA, United States  
Info: American Academy of Dermatology  
Tel.: 866-503-SKIN (7546)/847-240-1280  
Fax: 847-240-1859  
E-mail: MRC@aad.org

Στον Έρπητα Ζωστήρα...

# Brivir®

BRIVUDIN

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ**

**& γρήγορα!**

**2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικό συστατικό:** Κάθε δισκίο περιέχει 125mg brivudin. Για το δισκίο, βλέπε παρ. 6.1. **4.3. Αντενδείξεις:** Το BRIVIR® δεν πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα άλλα συστατικά του. **4.4. Άδεια μετά μεταβολισμού/πρωτογενή:** Η χρήση του BRIVIR® αντενδείκνυται σε ασθενείς, υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, ειδικά εάν λαμβάνουν 5-Fluorouracil (5-FU), συμπεριλαμβανομένων και των ακεταμινοφαίνης τοπικής χρήσης, των προαργμάτων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-Fluorouracil ή/και caracitabine, floxuridine, tegafur και προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών ή άλλων 5-Fluoropyrimidines (βλέπε επίσης παρ. 4.4 και 4.5). **4.5. Άδεια μετά ανασυνθέσεως:** Η χρήση του BRIVIR® αντενδείκνυται σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια όπως π.χ. αυτούς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, άλλα ανοσοκατασταλτικά αγωγή ή υπό θεραπεία με flucytosine για σοβαρές μυκητιασικές μυκητιάσεις. **Παιδιά:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του BRIVIR® σε παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί ανατομικά και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η χρήση του. **Κίνηση και γαλακσία:** Το BRIVIR® αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλακσίας (βλέπε επίσης παρ. 4.6.). **4.8. Αντεπιδημιτικές ενέργειες:** Η brivudin χορηγείται σε περισσότερους από 3900 ασθενείς σε κλινικές μελέτες. Η πιο σοβαρή αντίδραση, που απονέμει συμβάν, ήταν η ηπατίτιδα. Επίσης, αυτή η αντίδραση δια καταγράφηκε κατά τη διάρκεια έρευνας μετά την κυκλοφορία. Η μόνη συνήθως αντιβιωματική αντίδραση ήταν η ναυτία (2,1%). Οι επώμυνες οσικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (οστεοαλγία και οσάρες) ήταν σπάνιες που αναφέρθηκαν με το ναυτικό δισκίο και με φάρμακα της ομάδας SDCs. Έτσι επίσης φερόταν από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία ότι η brivudin επηρέασε στο δίσκιο και του υποδόριου κατά την ανάλυσή τους τη διακριτική κλινική χρήση του προϊόντος, όπως είναι η φωνή και από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία. Η συστομία και η ελάτωση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων απαιτούνται σε αυτές που εμφανίζονται σε άλλα οπτικά ναυτολόγια της ίδιας κατηγορίας. **Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών:** Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της brivudin ανάλογα με το οργανικό σύστημα κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας.

Οργανικό σύστημα	Συνήθεις (1-10%)	Ασυνήθεις (0,1-1%)	Σπάνιες (0,01-0,1%)	Άγνωστες
Διαταραχές όρασης και λεμφικό συστήματος Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος		Αιμοκαταπνοαίωμα, μισονομία, αναμία, λεμφκοκυττωματώδης μονοκυττωματώδης Αλλεργικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (περιφερικό οίδημα και οίδημα της γλώσσας, κερίλια, βρογχίτιδα, άσθμη και προκρίση, κνίση, εξιδρώματα, αυξημένη εφίδρωση, βίαιος, δύσπνοια, βρογχόσπασμος, αναρτία)	Βρομοπενία	
Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης Ψυχιατρικές διαταραχές		Αιμυμία, σπυδαίο διαταραχή Κεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγος, υπνηλία, παρασθένια	Παροισθησία, οσφυϊκή κατάσταση	
Διαταραχές νεφρικού συστήματος Διαταραχές υπλών και λεμφικού Αγγειακές διαταραχές		Υπέρταση	Δυσουσία, πρήξιμο Πόνος στα αυτιά Ψευδία	Διαταραχή καρδιάς
Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος Ηπατοχολικές διαταραχές Διαταραχές δέρματος και υποδόριων ιστών	Ναυτία	Δυσπεψία, έμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια, κνινοφαγία, δυσκοιλιότητα Πυλαϊκή ήπαρ, αυξημένο ηπατικό ένζυμο	Ηπατίτιδα, αύξηση της αλκαρυλίνης στο αίμα	Όξια ήπιατα ανεπιθύμητα Εξάνθημα σπυδαίο, έκζεμα, επιδημιτική δερματίτιδα, πολυμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens Johnson
Μυοσκελετικές διαταραχές Γενικές διαταραχές και συστέλικη χρησιμότητα		Εξοστέωση, κόπωση, γρημιάση συνδρόμη (αίσθημα κόπωσης, πυρετός, πόνος, ρίγη)	Όσθα άλγη	

ΧΤ: 63,89 €, ΝΤ: 55,58 €, ΑΤ: 91,86 €

**Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση**

Το BRIVIR® και η 5-fluorouracil συμπεριλαμβανομένων και των ακεταμινοφαίνης τοπικής χρήσης ή των προαργμάτων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. caracitabine, floxuridine και tegafur) ή προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών και άλλων 5-fluoropyrimidines π.χ. flucytosine δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν αρχίσει η θεραπεία με φάρμακα της ομάδας 5-fluoropyrimidine. Ως μια επιπλέον προφύλαξη, πρέπει να ελέγχεται η δραστηριότητα του ενζύμου DPD πριν αρχίσει οποιαδήποτε θεραπεία με φάρμακα της ομάδας της 5-fluoropyrimidine σε ασθενείς που προσφύονται έλαρουν BRIVIR®.

Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στη Menarini Hellas.

**MENARINI HELLAS A.E.**

Av. Διαμβρογών 7, 104 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 8316111-3, Fax: 210 8317 343, e-mail: menarini@atenet.gr

# Topiderm®

flutrimazole 1%

- ✓ Ισχυρή Αντιμυκητιασική Δράση
- ✓ Επιπρόσθετη Αντιφλεγμονώδης Δράση



*"Drugs such as flutrimazole, with dual anti-inflammatory/antifungal activity, may be advantageous in the treatment of topical fungal infections with an inflammatory component."\**

\* Merlos M, et al Inflamm Res. 1996 Jan;45(1):20-5.


## Ένα Βήμα Μπροστά στη Θεραπεία των μυκητιασικών λοιμώξεων

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** TOPIDERM® κρέμα 1% w/w, TOPIDERM® δερματικό διάλυμα 1% w/v. **Φαρμακοτεχνική μορφή:** 1. Κρέμα, 2. Δερματικό διάλυμα. **Αντενδείξεις:** Αντενδείκνυται σε καταστάσεις γνωστής υπερευαισθησίας σε αντιμυκητιασικά του τύπου της Imidazole ή σε κάποιο από τα συστατικά του προϊόντος. **Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ή ευαισθησία κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος, διακομьте τη θεραπεία και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Δεν υπάρχει επαρκής κλινική εμπειρία σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Πρέπει να δίδεται μεγάλη σημασία στην προσωπική υγιεινή για την αποφυγή επιμόλυνσης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Κρέμα: Ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση του TOPIDERM® έχουν παρατηρηθεί στο 8% των ασθενών σε κλινικές μελέτες με το φάρμακο. Οι συνθεότερες των ενεργειών αυτών ήταν ελαφρό αίσθημα καούσου, ερεθισμός, κνησμός και ερυθθμα στην περιοχή επάλειψης. Δερματικό διάλυμα: Κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν ανάλογη με την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε για επάλειψη. Σε ποσοστό 35% των ασθενών με διάγνωση ποικίλλου τύπου και οι οποίοι ακολουθούσαν το προτεινόμενο δοσολογικό σχήμα εμφανίσθηκαν ερυθθμα της περιοχής επάλειψης και κνησμός τις πρώτες ημέρες της θεραπείας. Αντιθέτως μόνο το 5% των ασθενών με διάγνωση δερματοφυτίαση και δερματική καντιπίαση εμφάνισαν ερυθθμα και κνησμό στην περιοχή εφαρμογής. Υπερδοσολογία: Καμία γνωστή περίπτωση υπερδοσολογίας μέχρι σήμερα. Εάν από απροσέχια το προϊόν ληφθεί από το στόμα πρέπει να αντιμετωπισθεί συμπτωατικά. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** TOPIDERM® (Γέλη) 1% w/v. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Γέλη. **Αντενδείξεις:** Αντενδείκνυται σε καταστάσεις γνωστής υπερευαισθησίας σε αντιμυκητιασικά του τύπου της Imidazole ή σε κάποιο από τα συστατικά του προϊόντος. **Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ή ευαισθησία κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος, διακομьте τη θεραπεία και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Δεν υπάρχει επαρκής κλινική εμπειρία σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Πρέπει να δίδεται μεγάλη σημασία στην προσωπική υγιεινή για την αποφυγή επιμόλυνσης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Όπως και με τη μορφή της κρέμας του TOPIDERM® είναι πιθανόν να εμφανιστούν ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συνθεότερες των ενεργειών αυτών είναι ελαφρό αίσθημα καούσου ερεθισμός κνησμός και ερυθθμα στην περιοχή επάλειψης. Κατόχος άδειας κυκλοφορίας: OLVD S SCIENCE A.E. Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. 210 5281850. **Επιστημονικό Τμήμα:** Τηλ.: 2105281731. Τμήμα Φαρμακοπαγμένησης: Τηλ.: 2105281805. Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην εταιρεία Olvos Science A.E.



# Imunofar®

Ciclosporin 25mg-50mg-100mg



**Betatape®**  
ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΗ 2,25 mg  
ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΟ ΕΠΙΘΕΜΑ



ANGELINI

ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.

ΑΧΑΪΑΣ 5 & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ, ΘΛΑ.: 210 6269200 - FAX: 210 8071688 • E-mail: faran@faran.gr