



Εαρινή Ημερίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
HYATT REGENCY

ELIDEL[®]
(pimecrolimus) Cream 1%



LAMISIL[®]
TERBINAFINE



FAMVIR[®]
famciclovir
250mg 500mg



**MERZ
SPEZIAL
DRAGEES**

Υγιή μαλλιά
Γερά νύχια
Λαμπερή επιδερμίδα



Γερμανικό προϊόν

Μόνο στα
Φαρμακεία

Η ομορφιά είναι εσωτερική δύναμη.

Το σύμπλεγμα βιταμινών, ιχνοστοιχείων και αμινοξέων που περιέχουν τα **MERZ SPEZIAL DRAGEES** δίνει στον οργανισμό την πολύτιμη «πρώτη ύλη» στην ιδανική αναλογία και ποσότητα, για υγιή, λαμπερά μαλλιά, συμπαγή και σκληρά νύχια, φωτεινή και ελαστική επιδερμίδα.

Συστατικά: Βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6, Β12, C, E, Φολικό Οξύ, Βιοτίνη, Παντοθενικό Οξύ, Νικοτιναμίδιο, Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Κυστίνη, Μεθειονίνη

- 1 σακχαρόπηκτο δύο φορές ημερησίως.
- Ένα φιαλίδιο Merz Spezial Dragees διαρκεί για 30 ημέρες.

NOVARTIS

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τ.Θ. 52001
144 10 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 281 1712
www.novartis.gr
ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΓΡΑΦΗ: 210 282 8812

Γραφείο Θεσσαλονίκης:
Βασ. Όλγας 216
551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 424 039



BIANEX Α.Ε. ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
Γραφείο Επιστημονικής Ενθάρτυσης
• ΑΘΗΝΑ: Οδός Τασούλου 146 71 Ν. Ερυθρού, Τηλ.: 210 8009111
• E-Mail: mailbox@bianex.gr
• INTERNET: http://www.bianex.gr
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Β.Κατζή 2, Τηλ: 2310 840440 VE9135

OCT/2009/ELD/AD/5

FarmaSyn SA

Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12133 Περιστέρι
Τηλ. 210 5777140 • Fax: 210 5788791
e-mail: farmasyn@otenet.gr • www.farmasyn.gr

Γραφείο Β. Ελλάδος: Μαιάνδρου & Αδμήτου 27, 56224 Εύοσμος
Τηλ. 2310 703856 • Fax: 2310 703178
e-mail: thess@farmasyn.gr

Παραγωγός:
Merz Pharmaceuticals
GmbH D 60318 Frankfurt



REVERSE



ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στην Εαρινή Ημερίδα της ΕΔΑΕ που παραδοσιακά γίνεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή τη χρονιά, η ημερίδα μας είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Γιώργου Γραμματικόπουλου, που ξεχώρισε πέραν των ιατρικών ικανοτήτων του και για τον ιδιαίτερο ζήλο με τον οποίο υπηρέτησε την ειδικότητά μας.

Αναγγέλλω με μεγάλη χαρά τη συμμετοχή νέων συναδέλφων στο πρόγραμμα της ημερίδας, που πλαisiώνουν δυναμικά και με ξεχωριστό ενθουσιασμό την προσπάθεια και την αφοσίωσή μας στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση.

Στα πλαίσια της συνεργασίας και της ομαδικότητας που μας διακρίνει, σας διαβεβαιώνω ότι ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή και την προβολή οιαδήποτε εκ των μελών μας θεωρεί ότι έχει κάτι σημαντικό να προσφέρει στους υπόλοιπους.

Αν και οι εποχές που ζούμε είναι αρκετά δύσκολες για όλους και ειδικά για τον κλάδο μας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η ΕΔΑΕ παρακολουθεί τα γεγονότα με ιδιαίτερη προσοχή και είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να περιφρουρήσει την ειδικότητά μας.

Καλό Πάσχα σε εσάς και τις οικογένειές σας!

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Δερματολογικής
&
Αφροδισιολογικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ρηγόπουλος



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος	Δ. Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος	Π. Σταυρόπουλος
Γεν. Γραμματέας	Γ. Χ. Χαϊδεμένος
Ταμίας	Α. Στρατηγός
Ειδ. Γραμματέας	Ι. Μπάρκας
Μέλη	Ε. Κουμαντάκη Δ. Σωτηριάδης

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος	Χρυσομάλλης Φώτιος
Μέλη	Νούτσος Κωνσταντίνος Μουλοπούλου Αικατερίνη

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παναγιωτόπουλος Αντώνιος
Σαρμαντά Άννα
Καυκάς Ηλίας

Έδρα: Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Γραμματεία: κα Δήμητρα Σπυροπούλου
Τηλ.: 210 7295606, Fax: 210 7295606

Διεύθυνση: Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Ι. Δραγούμη 5,
161 21 Καισαριανή, Αθήνα

E-mail: edaegr@hotmail.com, edae@edae.gr
<http://www.edae.gr>

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αθήνα
Τηλ: 210 6048260, Fax: 210 6047457, E-mail: fsakka@free-spirit.gr



ΧΟΡΗΓΟΙ

Εταιρείες φαρμάκων, καλλυντικών και ιατρικών συσκευών, που στήριξαν οικονομικά την Φθινοπωρινή Ημερίδα της εταιρείας στις 18 Σεπτεμβρίου 2010 στα Ιωάννινα

- ABBOTT LABORATORIES ABEE
- ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
- BAYER HELLAS ABEE
- CASTALIA LAB DERMATOLOGIQUES
- ECOMED-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.
- FARAN LABORATORIES S.A.
- FREZYDERM ABEE
- GABRIEL HEALTH
- GALDERMA HELLAS S.A.
- JANSSEN
- JOHNSON & JOHNSON HELLAS
- LA ROCHE POSAY
- LEO PHARMA HELLAS
- LIDS MEDICAL LTD
- MENARINI HELLAS A.E.
- MESSER –ΟΥΖΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.
- MSD
- NEXUS MEDICALS A.E.
- OLVOS SCIENCE
- PFIZER HELLAS A.E.
- PROTON PHARMA
- SADENT AEBE
- STIEFEL, A GSK COMPANY
- UCB S.A.
- BIANEΞ Α.Ε.

Η εταιρεία **PFIZER HELLAS A.E.** προσέφερε τον καφέ,
η εταιρεία **NEXUS MEDICALS A.E.** προσέφερε το γεύμα και
η εταιρεία **LEO PHARMA HELLAS** προσέφερε το επίσημο δείπνο στους συνέδρους.
Η εταιρεία **GABRIEL HEALTH** επιμελήθηκε την εκτύπωση του προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τις εταιρείες αυτές για την προσφορά τους.



Εταιρείες φαρμάκων, καλλυντικών και ιατρικών συσκευών, που στήριξαν οικονομικά το Κλινικό Φροντιστήριο «Ακμή: Από το Α έως το Ω» της εταιρείας στις 29 Ιανουαρίου 2011 στο Καρπενήσι.

- BAYER HELLAS ABEE
- FREZYDERM ABEE
- GALDERMA HELLAS S.A.
- OLVOS SCIENCE A.E.
- STIEFEL, A GSK COMPANY

Η εταιρεία **GABRIEL HEALTH** επιμελήθηκε την εκτύπωση του προγράμματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τις εταιρείες αυτές για την προσφορά τους.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

09.00- 10.00

Έναρξη Συνεδρίασης – Χαιρετισμός
**ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**
(Διάρκεια κάθε ανακοίνωσης 7 λεπτά
συμπεριλαμβανομένης και της συζήτησης)
Πρόεδροι: Π. Σταυρόπουλος, Κ. Βαλαρούτσος

**1. Μετάσταση στο δέρμα από αδιάγνωστο
αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα και πρωτοπαθές
αδενοκαρκίνωμα δέρματος**

Ι. Παπαδόπουλος¹, Α. Παππάς²,
Άννα Ανδρεάδου³, Φλωρεντίνα-Σύλβια Δελλή¹,
Ιωάννα Μαντέκου – Λεφάκη¹

¹ Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

² Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ,
ΓΝΘ Παπαγεωργίου

³ Πανεπιστημιακή Παθολογική Ογκολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Παπαγεωργίου

2. Ιστικοκυττάρωση από κύτταρα Langerhans

Πολυξένη Γιδροκώστα, Αγγελική Πολίτη, Ευτέρπη
Ζαφειρίου, Ελένη Κατράνα, Αγγελική-Βικτωρία Ρουσσάκη
Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Παν. Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας

**3. Γενικευμένη οξεία εξανθηματική φλυκταίνωση μετά
από χορήγηση anti-TNF παράγοντα για την θεραπεία
της ρευματοειδούς αρθρίτιδος**

Ελένη Κλήμη

Θριάσιο Νοσοκομείο, Ελευσίνα

4. Λεμφωματοειδής Κοκκιωμάτωση.

Πολυξένη Γιδροκώστα, Ελένη Κατράνα, Ευτέρπη
Ζαφειρίου,
Αγγελική Πολίτη, Αγγελική-Βικτωρία Ρουσσάκη
Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Παν. Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

5. Υποδερματίτιδα από έλλειψη α1-αντιθρυσίνης (ΑΙΑΤ)

Μαρίνα Παπαγεωργίου, Ανατολή Καρτερίδου,
Ζωή Απάλλα, Φλωρεντίνα-Σύλβια Δελλή,
Ιωάννα Μαντέκου-Λεφάκη
Κρατική Κλινική Νοσοκομείου Δερματικών και Αφροδισίων
Νόσων Θεσσαλονίκης

6. Ερυθρηματοφλυκταινώδες υποτροπιάζον εξάνθημα σε άνδρα 46 ετών

Α. Πετρίδης, Αγγελική Μπεφόν, Π. Παναγάκης,
Π.Κωστάκης, Βασιλική Χασάπη, Ελένη Πολυχρονάκη, Μαρία
Παπουτσάκη, Α.Παναγιωτόπουλος,
Μαρία Κατσούλη.

Γ' Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»

7. Σύνδρομο DRESS: Μια σοβαρή, ενίοτε απειλητική για τη ζωή, αντίδραση υπερευαισθησίας σε φάρμακα.

Μαρίνα Παπαγεωργίου¹, Ανατολή Καρτερίδου¹,
Μαρία Σμαραγδή², Ιωάννα Μαντέκου-Λεφάκη¹

¹ Κρατική Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,
Θεσσαλονίκης

² Ειδική Παθολόγος Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,
Θεσσαλονίκης

8. Κοκκιωματώδης χειλίτιδα ως δείκτης εκδήλωσης υποκείμενης συστηματικής νόσου

Σ. Χαραλαμπίδης, Α. Μαντάς, Αικατερίνη Πατσαοτή,
Δ. Καλαμπαλίκης, Μυρτώ Τρακατέλλη, Δ. Σωτηριάδης
Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ,
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

10.00-10.15

ΒΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Προεδρείο: Γ. Χαϊδεμένος

Α. Λάλλας: «Η συμβολή της Δερματοσκόπησης στη διάγνωση φλεγμονωδών δερματοπαθειών»

Ουλές που προέρχονται από

- ✓ χειρουργικές επεμβάσεις
- ✓ τραύματα
- ✓ εγκαύματα
- ✓ ακμή
- ✓ ραγάδες



«Σβήστε» τις με



MEDERMA[®]
SKIN CARE FOR SCARS

FarmaSyn SA

Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12133 Περιστερί
Τηλ. 210 5777140 • Fax: 210 5788791
e-mail: farmasyn@otenet.gr • www.farmasyn.gr

Γραφείο Β. Ελλάδος: Μαιάνδρου & Αδμήτου 27, 56224 Εύσομος
Τηλ. 2310 703856 • Fax: 2310 703178
e-mail: thess@farmasyn.gr

Παραγωγός:
Merz Pharmaceuticals
GmbH D 60318 Frankfurt





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

13.00-14.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Προεδρείο: Δ. Σωτηριάδης – Δ. Ιωαννίδης
Θέμα: «Αλλεργικά Δερματολογικά Νοσήματα»

Ε. Βακιρλής: «Παθοφυσιολογία Δερματίτιδας εξ επαφής»
Ελισάβετ Λαζαρίδου: «Διάγνωση Δερματίτιδας εξ επαφής –
Επιδερμίδικές δοκιμασίες»

Χριστίνα Φωτιάδου: «Αντιμετώπιση δερματίτιδας εξ επαφής»
Κ. Καλοκασιδής: «Κνίδωση. Βασικά στοιχεία παθοφυσιολογίας»
Αικατερίνη Πατσαοτή: «Κνίδωση. Κλινικές μορφές –
Διαφορική διάγνωση»
Δ. Καλαμπαλίκης: «Κνίδωση. Θεραπευτική αντιμετώπιση»

14.30 – 15.30

ΓΕΥΜΑ (χορηγός JANSSEN)

15.30 – 17.30

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Ζ. Πολυζώνης
Θέμα: «Νέες τεχνολογίες στη Δερματοχειρουργική»
Ι. Κατσαντώνης: Αντιοξειδωτικά: Τι νεότερο
Δήμητρα Ντάσιου-Πλακίδα: Ανανέωση του προσώπου με
αιμοπετάλια εμπλουτισμένα με πλάσμα (PRP) σε συνδυασμό με
εμφύτευση αυτόλογου λίπους
Μαρία Μαυρίδου: Χρήση νέων τεχνολογιών στην ανανέωση
προσώπου
Ζ. Πολυζώνης: Εφαρμογές με laser τύπου fractional σε
συνδυασμό με άλλες τεχνικές στη δερματολογία

17:30-19:00

**Μη επεμβατικό face-lift (αποκατάσταση παρειών-jaw line -
ρυτίδες), με προϊόντα της εταιρείας DERMOSKIN (FILORGA)**

Εφαρμογή: Ι. Κατσαντώνης



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

**1. ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΠΟ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ**

**Ι. Παπαδόπουλος¹, Α. Παππάς², Άννα Ανδρεάδου³, Φλωρεντίνα-Σύλβια Δελλή¹,
Ιωάννα Μαντέκου – Λεφάκη¹**

¹ Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
² Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
³ Πανεπιστημιακή Παθολογική Ογκολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα εμφανίζεται συνήθως στην ηλικία μεταξύ των 40 και 69 ετών με ελαφρά υπερχώ στους άνδρες. Τα συμπτώματα είναι σπάνια και ο όγκος έχει την τάση να είναι κλινικά σιωπηρός. Τα νεοπλάσματα των εσωτερικών οργάνων μεθίστανται στο δέρμα με συχνότητα που ανέρχεται στο 0,7 – 10% και μπορεί να αποτελούν την πρώτη κλινική εκδήλωση, σημείο υποτροπής ή εύρημα τελικού σταδίου της νόσου. Το πρωτοπαθές αδενοκαρκίνωμα του δέρματος παρουσιάζεται με την μορφή ενός μονήρους οζιδίου συνήθως στο τριχωτό της κεφαλής είτε στον κορμό διαμέτρου μέχρι 8 cm. Σπάνιας μεθίσταται και μπορεί να διαδράμει ασυμπτωματικώς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ιστολογική εικόνα του μεταστατικού αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα στο δέρμα απαιτεί διαφορική διάγνωση από την ιστολογική εικόνα του πρωτοπαθούς αδενοκαρκινώματος του δέρματος λόγω της μεγάλης ομοιότητας που παρουσιάζουν. Η τελική διάγνωση τίθεται με βάση τον ανοσοφαινότυπο του καρκινώματος και τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο του ασθενούς.

2. ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ LANGERHANS

**Πολυξένη Πιδαροκόστα, Αγγελική Πολίτη, Ευτέρπη Ζαφειρίου, Ελένη Κατράνα,
Αγγελική-Βικτωρία Ρουσσάκη**

Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Παν. Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η ιστοκυττάρωση Langerhans είναι μια σπάνια και σοβαρή νόσος. Τα ευρήματα από το δέρμα είναι συχνά. Συνήθως εκδηλώνεται με α) σμηγματορροϊκού τύπου δερματίτιδα β) βλατίδες και φλύκταινες στον κορμό γ) ελκώσεις ιδιαίτερα στις πτυχές. Η νόσος προσβάλλει εσωτερικά όργανα. Το δέρμα, τα σπλάχνα, οι πνεύμονες και τα οστά διηθούνται από κύτταρα Langerhans. Η βιοψία του δέρματος είναι διαγνωστική.

Παρουσιάζουμε περίπτωση άνδρα 51 ετών, ο οποίος προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία της Πανεπιστημιακής Δερματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Λάρισας με ελκώσεις μασχαλαίων πτυχών από τριμήνου. Από το ιστορικό του ασθενούς αναφέρεται αδένωμα υπόφυσης ενώ ανευρέθησαν αλλοιώσεις οστών κάτω γνάθου και καταστροφή οδόντων. Η διάγνωση της ιστοκυττάρωσης ετέθη από την ιστολογική εξέταση του δέρματος.



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

3. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ANTI- TNF ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ

Ελένη Κλήμη, Δερματολόγος

Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας

Ασθενής 58 ετών προσήλθε στα επείγοντα Δερματολογικά Ιατρεία του Θριασίου Νοσοκομείου αιτιώμενος δερματικό εξάνθημα και γλωσσοδυνία 4 μέρες μετά την χορήγηση anti- TNF παράγοντα για ρευματοειδή αρθρίτιδα infliximab. Επρόκειτο για τον 4ο κύκλο infliximab.

Η κλινική εικόνα αποκάλυψε διάσπαρτα φλυκταινίδια στον κορμό και στα άκρα και οσχεοειδή γλώσσα. Η κλινική εικόνα και η ιστολογική εξέταση από βλάβη ήταν συμβατές με γενικευμένη οξεία εξανθηματική φλυκταινώση (AGEP). Το εξάνθημα υφέθη αυτόματα μετά από πάροδο 4 ημερών αλλά υποτροπίασε στην επόμενη χορήγηση του φαρμάκου για να υφεθεί πάλι αυτόματα. Η οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταινώση συσχετίζεται με την λήψη αντιβιοτικού όπως αμοξικιλίνης, αμπικιλίνης, ιμιπενέμης, καρβαμαζεπίνης, αναστολέων των διαύλων ασβεστίου σπανιότερα με την οφλοξασίνη.

Ο παράγων νέκρωσης των όγκων προκαλεί πυρετό, συνδέεται με νυξημένη επιβίωση μετά από βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη και ενεργοποιεί τα πολυμορφοπύρρνα λευκά αιμοσφαίρια τα πωσινόφιλα και άλλα φλεγμονώδη κύτταρα.

Στον ασθενή μας φαίνεται ότι υπήρξε τις πρώτες μέρες μετά την χορήγηση του φαρμάκου κινητοποίηση φλεγμονωδών κυττάρων από τον τόπο της φλεγμονής-αρθρώσεις στο δέρμα εξ' ου και ο σχηματισμός φλυκταινιδίων.

Η αντίδραση αυτή φαίνεται ότι είναι καλοήθης υφίεται αυτόματα και δεν συσχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα.



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

4. ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

Πολυξένη Πιδαροκώστα, Ελένη Κατράνα, Ευτέρπη Ζαφειρίου, Αγγελική Πολίτη, Αγγελική-Βικτωρία Ρουσσάκη

Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Παν. Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση είναι μια σπάνια συστηματική λεμφοϋπερπλαστική πάθηση Β-κυτταρικής αρχής με συνοδό αντιδραστική αύξηση Τ-λεμφοκυττάρων, η οποία προσβάλλει τους πνεύμονες, το δέρμα, το ΚΝΣ και τους νεφρούς. Στο 50% περίπου των περιπτώσεων υπάρχει δερματική συμμετοχή, και πιο σπάνια περιορίζεται μόνο στο δέρμα. Οι δερματικές εκδηλώσεις ποικίλλουν από ερυθηματώδεις βλατίδες και υποδόρια οζίδια, μέχρι ελκωτικές βλάβες συνοδευόμενες από πόνο και κνησμό. Υπάρχει συσχέτιση με λοίμωξη από τον ιό Epstein- Barr. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ιστολογική εικόνα της νόσου, στην οποία παρατηρείται διήθηση του δέρματος από μια λεμφοϋπερπλαστική εξεργασία με αγγειοκεντρικό πρότυπο, με παρουσία Β- αλλά και Τ-λεμφοκυττάρων και συνυπάρχουσες περιοχές νέκρωσης. Οι περισσότεροι ασθενείς υποβάλλονται σε πολυ-χημειοθεραπεία, ωστόσο, έχουν περιγραφεί περιπτώσεις αυτόματης υποχώρησης της νόσου.

Το περιστατικό που θα περιγραφεί αφορά άρρενα ασθενή ηλικίας 74 ετών, ο οποίος από έτους εμφάνισε βλατιδώδες εξάνθημα ράχης και μηρού, οι οποίες εξελίχθηκαν σε ελκωτικές βλάβες. Η ιστολογική μελέτη, με συνεκτίμηση των κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων, επιβεβαίωσε τη διάγνωση της λεμφωματοειδούς κοκκιωμάτωσης. Ο ασθενής υπεβλήθη σε θεραπεία με becharotene, στην οποία και ανταποκρίθηκε αρκετά καλά.



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

5. ΥΠΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ Α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗΣ (Α1ΑΤ)

Μαρίνα Παπαγεωργίου, Ανατολή Καρτερίδου, Ζωή Απάλλα, Φλωρεντίνα-Σύλβια Δελλή, Ιωάννα Μαντέκου-Λεφάκη

Κρατική Κλινική Νοσοκομείου Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: η α1-αντιθρυψίνη είναι ένας αναστολέας της θρυψίνης, της ελαστάσης των ουδετεροφίλων και γενικά των πρωτεασών. Η έλλειψη της α1-αντιθρυψίνης αποτελεί τον συχνότερο αιτιολογικό παράγοντα εμφάνισης πνευμονικού εμφυσήματος σε νεαρή ηλικία, ακόμη και σε μη καπνιστές. Μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο. Σε έλλειψη α1-αντιθρυψίνης, εκτός από τη βλάβη στους πνεύμονες μπορεί σπανιότερα να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ηπατικής νόσου ή/και βλαβών νεκρωτικής υποδερματίτιδας. Στην δεύτερη περίπτωση παρατηρούνται ερυθρά υποδόρια οζίδια κυρίως στους μηρούς, τον κορμό και τα εγγύς τμήματα των άκρων, που ελκώνονται αυτόματα. Υπάρχει νέκρωση λίπους. Τα έλκη είναι ανώδυνα και εμφανίζουν εκροή καθαρού-στείρου-κιτρινωπού υγρού. Μετά την αποδρομή τους καταλείπουν ουλή.

Παρουσίαση περιστατικού: παρουσιάζουμε την περίπτωση άνδρα ασθενή 27 ετών που προσήλθε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας λόγω ερυθρών, ήπια επώδυνων στην εν τω βάθει πίεση, οζιδίων από 10μέρου. Κάποιες από τις βλάβες εμφάνιζαν κεντρική νέκρωση και εκροή κιτρινωπού υγρού. Ο ασθενής είχε διαγνωσθεί προ 2 ετών με έλλειψη α1-αντιθρυψίνης και κατά την ημέρα της εισαγωγής του στην κλινική μας εμφάνιζε ήδη πνευμονικό εμφύσημα, όντας στη λίστα για μεταμόσχευση πνευμόνων από δμήνου. Η άμεση μικροβιολογική εξέταση από έκκριμα βλάβης έδειξε λίγα πυοσφαίρια και σπάνιους gram (+) κόκκους και στην καλλιέργεια απομονώθηκε staphylococcus aureus. Η ιστολογική εξέταση από βλάβη δέρματος ήταν συμβατή με νεκρωτική λοβιώδη υποδερματίτιδα. Ο ασθενής τέθηκε σε αντιβιοτική αγωγή χωρίς βελτίωση όμως της κλινικής του εικόνας. Λαμβάνοντας υπόψη το πνευμονολογικό του ιστορικό τελικά τέθηκε σε αγωγή με δαψόνη. Οι βλάβες άρχισαν να επουλώνονται και έναν μήνα μετά την έναρξη της αγωγής με δαψόνη δεν υπήρχε εκροή υγρού από τις δερματικές βλάβες και το σύνολό τους ήταν σε ύφεση.

Συζήτηση: η υποδερματίτιδα από έλλειψη α1-αντιθρυψίνης αποτελεί μια πολύ σπάνια νοσολογική οντότητα, ακόμη και επί ομόζυγου φαινοτύπου Z, που αποτελεί και τη σοβαρότερη έκφραση της έλλειψης. Θεραπευτικά χρησιμοποιούνται : δαψόνη, IV χορήγηση Α1ΑΤ, στεροειδή, δοξκυκλίνη με τα καλύτερα αποτελέσματα να εμφανίζονται με τα δύο πρώτα. Τελευταία έχει επικρατήσει η άποψη ότι σε κάθε περίπτωση νεκρωτικής υποδερματίτιδας θα πρέπει να γίνεται μέτρηση της α1-αντιθρυψίνης.



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

6. ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 46 ΕΤΩΝ

Α. Πετρίδης, Αγγελική Μπεφόν, Π. Παναγάκης, Π. Κωστάκης, Βασιλική Χαοάπη, Ελένη Πολυχρονάκη, Μαρία Παπουτσάκη, Α. Παναγιωτόπουλος, Μαρία Κατσούλη.

Γ' Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»

Ασθενής 46 ετών νοσηλεύθηκε στην κλινική μας με ερυθρές πολυκυκλικές πλάκες με φλύκταινες και απολέπιση στην περιφέρειά τους, εντοπιζόμενες στον κορμό, στα άκρα με επίταση στις πτυχές και μικρές κατά τόπους πομφόλυγες με συνοδό ήπιο κνησμό. Το εξάνθημα χρονολογείται από 4ετίας, με εξάρσεις και υφέσεις. Επιδείνωση των βλαβών παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με την εφίδρωση και την χρήση συνθετικών ρούχων. Ατομικό και οικογενειακό αναμνηστικό ελεύθερο.

Από τον παρακλινικό του έλεγχο προκύπτει ASTO (+), ενώ οι λοιπές εξετάσεις ήταν σε φυσιολογικά όρια. Στον ασθενή έγιναν ιστολογική εξέταση, άμεσος και έμμεσος ανοσοφθορισμός που απέβησαν αρνητικοί, καρκινικοί δείκτες που ήταν φυσιολογικοί. Από την ιστολογική εξέταση προέκυψε ότι πρόκειται για v. Sneddon -Wilkinson. Ο ασθενής είχε άμεση ανταπόκριση σε θεραπεία με ασπιρρίνη 25 mg ημερησίως.

7. ΣΥΝΔΡΟΜΟ DRESS: ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ, ΕΝΙΟΤΕ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

Μαρίνα Παπαγεωργίου¹, Ανατολή Καρτερίδου¹, Μαρία Σμαραγδή², Ιωάννα Μαντέκου-Λεφάκη¹

¹Κρατική Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκης

²Ειδική Παθολόγος Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Το σύνδρομο DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) αποτελεί οξεία, ενίοτε απειλητική για τη ζωή αντίδραση υπερευαισθησίας σε φάρμακα, κατά την οποία συνυπάρχουν πυρετός, εξάνθημα, λεμφαδενοπάθεια και προσβολή εσωτερικών οργάνων με πωσινοφιλία στο περιφερικό αίμα, ως κυρίαρχα κλινικά συμπτώματα και εργαστηριακά ευρήματα. Τα συχνότερα ενοχοποιούμενα φάρμακα περιλαμβάνουν τα αντιεπιληπτικά, τις σουλφοναμίδες, την αλλοπουρινόλη, την μινοκυκλίνη, τη σπιρονολακτόνη και ο κατάλογος αυξάνεται. Η θνησιμότητα του συνδρόμου ανέρχεται στο 10% και αφορά κυρίως ασθενείς με σοβαρή πολυοργανική συμμετοχή (ήπαρ, πνεύμονες, νεφροί, εγκέφαλος).

Παρουσίαση περιστατικού: Παρουσιάζουμε την περίπτωση γυναίκας ασθενούς 39 ετών, που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μας από την παθολογική κλινική του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ξάνθης, όπου νοσηλεύονταν επί 3μέρου με πυρετό και κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα. Κατά την εισαγωγή της στην κλινική μας εμφάνιζε εκτεταμένο, ήπια κνησιμώδες εξάνθημα με την παρακάτω μορφή και εντόπιση: ερυθρότητα προσώπου με συνοδό οίδημα και πιτυρώδη απολέπιση, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού-άνω άκρων και μηρών καθώς και ερυθροϊώδες κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κνημών, με κατά τόπους συνυπάρχουσες πορφυρικές βλάβες. Δεν υπήρχε



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

εξάνθημα σε παλάμες και πέλματα. Οι βλεννογόνοι ήταν ελεύθεροι βλαβών. Είχε συνοδό τραχηλική, μασχαλιαία και βουβωνική λεμφαδενοπάθεια, ήπια αύξηση του μεγέθους του ήπατος-οριακό σπλήνα στον υπερηχογραφικό έλεγχο άνω κοιλίας, λευκοκυττάρωση, πωσινοφιλία, λεμφοκυττάρωση με παρουσία άτυπων και διεγερμένων λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα. Οι εργαστηριακές δοκιμασίες του ήπατος ήταν παθολογικές. Η ιστολογική εξέταση από βλάβη του δέρματος ήταν υπέρ του φαρμακευτικού εξανθήματος. Από το ιστορικό της έγινε γνωστό ότι τα συμπτώματα είχαν ξεκινήσει περίπου 20 ημέρες μετά την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής από ψυχίατρο με καρβιμαζεπίνη, υδροχλωρική αμιτρυπιλίνη και ντουλοξετίνη. Διακόπηκαν τα ύποπτα φαρμακευτικά σκευάσματα και η ασθενής τέθηκε σε p.o αγωγή με στεροειδές, με αποτέλεσμα την ταχεία κλινικο-εργαστηριακή της βελτίωση.

Συζήτηση: Παρουσιάζουμε το περιστατικό λόγω της σπανιότητας του συνδρόμου, η συχνότητα του οποίου ανέρχεται σε 1:1000 έως 1:10000, και της θνησιμότητάς του που μπορεί να ανέλθει στο 10% σε περίπτωση συστηματικής προσβολής. Ως εκ τούτου θα πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψιν μας επί σοβαρών φαρμακευτικών αντιδράσεων και να επαγρυπνούμε για την πρόληψη αναγνώριση προσβολής εσωτερικών οργάνων.

8. ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΧΕΙΛΙΤΙΔΑ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Σ. Χαραλαμπίδης, Α. Μαντάς, Αικατερίνη Πατσαοτή, Δ. Καλαμπαλίκης, Μυρτώ Τρακατέλλη, Δ. Σωτηριάδης

Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

Πρόκειται για μία χρόνια κοκκιωματώδη φλεγμονή που εμφανίζεται σε νεαρή κυρίως ηλικία και χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο και προοδευτικά επιδεινούμενο οίδημα των χειλέων. Το οίδημα περιστασιακά μπορεί να εντοπισθεί στις παρειές, στο μέτωπο, στα βλέφαρα και περιοφθαλμικά. Η αιτία είναι άγνωστη. Έχει αναφερθεί συσχέτιση με σύνδρομο Melkersson-Rosenthal, σαρκοείδωση, νόσο του Crohn, αλλεργικές αντιδράσεις, λοιμώξεις και έχει παρατηρηθεί σε παιδιά με μεταμόσχευση ήπατος. Η νόσος πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από αγγειοοίδημα κληρονομικό και επίκτητο, φυματίωση, σαρκοείδωση, νόσο του Crohn, οδοντικό απόστημα, αλλεργικές, αντιδράσεις και γενετικά σύνδρομα. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει ενδοσκόπηση γαστρεντερικού, ακτινογραφία θώρακος, πανοραμική οδόντων, patch test, μέτρηση μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και όπου κρίνεται απαραίτητο η ποζιτρονική τομογραφία θώρακος. Η θεραπεία της νόσου είναι δύσκολη και πολλές φορές είναι συνάρτηση της υποκείμενης συστηματικής πάθησης. Έχουν χρησιμοποιηθεί ενδοβλαβικές ενέσεις τριαμσινολόνης, αντιμικροβιακά και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, σταθεροποιητές μασοκυττάρων, κλοφaziμίνη, τακρολίμους, δαψιόν, infliximab. Η πορεία της νόσου είναι χρόνια και ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται περιοδικά για πιθανή εμφάνιση σαρκοείδωσης και νόσου του Crohn.



ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

AESTHETIC MEDICINE | DUBAI & UAE CRUISE
21-28 March 2011, Dubai, United Arab Emirates
INFO: Sea Courses Cruises
Tel.: 1-888-647-7327
Fax: 1-888-547-7337
E-mail: cruises@seacourses

EADV FOSTERING COURSE FOR TRAINEES/RESIDENTS IN INTERVENTIONAL COSMETICS - PRACTICAL HANDS-ON WORKSHOP ON BOTULINUM & FILLERS
26-27 February 2011, London
INFO: Christopher Rowland Payne
Website: www.eadv.org/fostering-courses/current-residents-courses/2011-training-course-interventional-cosmetics/

THIRD ANNUAL MEETING OF THE MULTIDISCIPLINARY INTERVENTIONAL COSMETICS GROUP OF THE RSM
28 February 2011, London
Organisation: Royal Society of Medicine
E-mail: Nicole.Leida@rsm.ac.uk

11TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR PHOTODYNAMIC THERAPY IN DERMATOLOGY (EURO-PDT)
11-12 March 2011, Paris, France
INFO: Tel.: +33 (0)1 46 43 33 42
Fax: +33 (0)1 46 24 88 38
E-mail: europdt2011@vista-fr.com

JEDDAH DERMATOLOGY & COSMETICS CONFERENCE
14-17 March 2011, Jeddah, Saudi Arabia
Jeddah Hilton
INFO: Conference Secretariat
Tel.: 966-505-612-701
Fax: 966-2-624-0000 ext 22765
E-mail: jeddaderm@hotmail.com
Website: www.jeddaderm.com

AESTHETIC MEDICINE | DUBAI & UAE CRUISE
21-28 March 2011, Dubai, United Arab Emirates
INFO: Sea Courses Cruises
Tel.: 1-888-647-7327
Fax: 1-888-547-7337
E-mail: cruises@seacourses

43RD ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN BURN ASSOCIATION (ABA)
March 29 - April 1, 2011, Chicago, Illinois, USA
INFO: Website: www.ameriburn.org/

31ST ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY FOR LASER MEDICINE AND SURGERY (ASLMS)
March 30 - April 3, 2011, Grapevine, Texas
INFO: Tel: 715-845-9283
Website: www.aslms.org/

2011 ANNUAL CONFERENCE OF THE AMERICAN SOCIETY FOR LASER MEDICINE AND SURGERY
March 30 - April 03, 2011, Grapevine, TX, United States
INFO: American Society for Laser Medicine and Surgery, 2100 Stewart Avenue, Suite 240, Wausau, WI 54401
Tel.: 715-845-9283
Fax: 715-848-2493
E-mail: information@aslms.org

WINTER ACADEMY OF DERMATOLOGY, 4th CONGRESS
7-10 April 2011, Lucerne, Switzerland
INFO: Conference Secretariat: Hevento Group
Tel.: 39-055-210-454
Fax: 39-055-283-686
E-mail: winteracademy@heventogroup.com, leonardo.fronticelli@heventogroup.com
Website: www.winteracademy.net

EIGHTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MELANOMA AND OTHER CUTANEOUS MALIGNANCIES
8-9 April 2011, New York, NY, United States
INFO: Customer Support
Tel.: 888-949-0045
Fax: 214-367-3402
E-mail: CustomerSupport@CancerLearning

8th EADV SPRING SYMPOSIUM
14-17 April 2011, Carlsbad, Czech Republic. Lazensky hotel THERMAL
Tel.: +420 602 322 900
Fax: +420 267 913 943
Website: carlsbad2011.eadv.org

DERMATOLOGY, INTERNAL MEDICINE, AND SURGERY UP TO DATE
17-19 April 2011, Hanoi, Vietnam
Melia Hotel
INFO: Dr. D. Czarniecki
Tel.: 613-988-70066
Fax: 613-988-70044
E-mail: dbczarnecki@gmail.com
Website: www.cme.au.com

11th ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΑΔΑ
«Επί της ...ουσίας»
13-14 Μαΐου 2011, Ζάππειο, Αθήνα
INFO: Γ' Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Τηλ.: 210-7222526

37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
17-21 Μαΐου 2011, Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα
Website: www.mednet.gr

22nd WORLD CONGRESS OF DERMATOLOGY
24-29 May 2011, Seoul, Korea
Seoul's Convention and Exhibition Center (COEX)
INFO: Secretariat
Tel.: +82234767700
Fax: +82234768800
E-mail: wcd2011@koconex.com
Website: www.wcd2011.org

HAIRGEN® 30 Softgel Caps

Saw palmetto + Grapeol + Olive leaf
Green tea + Vitamin A + L cystine

HAIRGEN® Foam 125ml

Saw Palmetto + Diamino-pyrimidine-3-oxide
Ginkgo Biloba + Sulphur/Aminoacids + Biotin

HAIRGEN® Shampoo 200ml

Saw Palmetto + Diamino-pyrimidine-3-oxide + Ginkgo Biloba
Sulphur/Aminoacids + Biotin + Glycolic Acid



Dynamic Formulation

 GABRIEL
HEALTH

boderm